¿Cuándo necesitan vacunas los niños y adolescentes?

Edad	HepB Hepatitis B	VRS-AcM	DTaP/Tdap Difteria, tétanos y tosferina (tos convulsa)	Hib *Haemophilus influenzae* tipo b	VPI Poliomielitis	PCV Conjugado neumocócico	RV Rotavirus	MMR Sarampión, paperas, rubéola	Varicela	HepA Hepatitis A	COVID-19	Dengue	VPH Virus del papiloma humano	Men-ACWY Meningococo	MenB Meningococo	Gripe
al nacer	✔	✔[2] (0–7 meses)														
2 meses	✔		✔	✔	✔	✔	✔									
4 meses	✔[1]		✔	✔	✔	✔	✔									
6 meses	✔ (6–18 meses)		✔	✔[1]	✔ (6–18 meses)	✔	✔[1]				✔[4] Se recomienda la vacuna contra el COVID-19 para todas las personas a partir de los 6 meses de edad					✔ (a partir de los 6 meses)
8 meses																
12 meses		✔[2] (8–19 meses)	✔[3] (15–18 meses)	✔ (12–15 meses)		✔ (12–15 meses)		✔ (12–15 meses)	✔ (12–15 meses)	✔✔ (2 dosis administradas con 6 meses de diferencia de forma rutinaria de los 12 a los 23 meses de edad) También se recomienda la vacuna HepA (2 dosis) para niños y adolescentes que no hayan sido vacunados previamente						
15 meses																
18 meses																
19 a 23 meses																
4 a 6 años			✔		✔			✔	✔							
7 a 10 años																La vacuna contra la gripe se recomienda cada año para todas las personas a partir de los 6 meses de edad
11 a 12 años			✔ (Tdap)									✔✔✔[5] La vacuna contra el dengue se recomienda para determinados niños	✔✔[6,7]	✔		
13 a 15 años																
16 a 18 años														✔	✔✔ [8,9,10]	

Una dosis cada otoño o invierno. Algunos niños menores de 9 años necesitan 2 dosis; pregúntele al proveedor de atención médica de su hijo si necesita más de 1 dosis.

NOTAS

1 Es posible que su hijo no necesite esta dosis dependiendo de la marca de vacuna que utilice su proveedor de atención médica.

2 Los bebés cuya madre no recibió una vacuna contra el VRS durante el embarazo y que sean menores de 8 meses y 0 días deben recibir anticuerpos preventivos contra el VRS (VRS-AcM) antes o durante la temporada de VRS (normalmente de octubre a marzo). Ciertos niños de alto riesgo (de 8 a 19 meses) necesitarán VRS-AcM antes de su segunda temporada de VRS.

3 Esta dosis de DTaP se puede administrar a partir de los 12 meses de edad si han transcurrido 6 meses desde la dosis anterior.

4 Por lo general, los niños de 5 años o más solo necesitan una dosis. El número de dosis para niños de 6 meses a 4 años viene determinado por la marca de vacuna.

5 Se recomienda a los niños de 9 a 16 años que vivan en Puerto Rico, Samoa Americana, Islas Vírgenes de los EE. UU., Estados Federados de Micronesia, República de las Islas Marshall y la República de Palau, y que tengan infección previa por dengue confirmada en laboratorio que reciban una serie de 3 dosis de la vacuna contra el dengue.

6 La vacuna contra el VPH es de rutina a los 11 o 12 años, pero puede iniciarse a los 9 años.

7 Los niños con ciertas afecciones médicas necesitarán una tercera dosis.

8 Esta vacuna se puede administrar a adolescentes sanos. También se recomienda para adolescentes con ciertas afecciones médicas.

9 Su hijo adolescente puede necesitar una dosis adicional dependiendo de la recomendación de su proveedor de atención médica.

10 Cuando se necesitan las vacunas MenACWY y MenB, se puede utilizar una vacuna combinada MenABCWY.

Immunize.org

FOR PROFESSIONALS www.immunize.org / **FOR THE PUBLIC** www.vaccineinformation.org

www.immunize.org/wp-content/uploads/catg.d/p4050-01.pdf
"When Do Children and Teens Need Vaccinations?"
Item #P4050-01 Spanish (12/18/2023)

Scan for PDF