

متى يحتاج الأطفال والمراهقون إلى التطعيمات؟

العمر	HepB التهاب الكبد الوبائي B	RSV- mAb	DTaP/Tdap الدفتيريا والتيتانوس والساهوق (السعال الديكي)	Hib المستدمية النزلية من النوع b	IPV شلل الأطفال	PCV المكورات الرئوية المتقارن	RV الفيروس العجلي	MMR الحصبة والكاف والحصبة الألمانية	الحماق الجدري المائي	HepA التهاب الكبد الوبائي A	كوفيد-19	حمى الضنك	HPV فيروس الورم الحليمي البشري	Men- ACWY	MenB	الإنفلونزا Flu
عند الولادة	✓	2✓ (7-0 شهور)														
شهران	✓		✓	✓	✓	✓	✓									
4 شهور	1✓		✓	✓	✓	✓	✓									
6 شهور	✓ (18-6 شهور)		✓	1✓	✓ (18-6 شهور)	✓	1✓									✓
8 شهور																
12 شهرًا		2✓ (19-8 شهور)								✓✓ (جرعتان يتم إعطاؤهما يفصل بينهما مدة 6 أشهر بشكل روتيني في عمر من 12 إلى 23 شهرًا)						
15 شهرًا			3✓ (18-15 شهور)						✓ (15-12 شهرًا)	✓ (15-12 شهرًا)						
18 شهرًا																
23-19 شهرًا										يُوصى أيضًا بإعطاء لقاح HepA (جرعتان) للأطفال والمراهقين الذين لم يسبق لهم الحصول على اللقاح						
4-6 سنوات			✓ (Tdap)		✓				✓	✓						
7-10 سنوات																
11-12 سنة													5✓✓✓ يُوصى بلقاح حمى الضنك لبعض الأطفال			
13-15 سنة																
16-18 سنة																

جرعة واحدة كل خريف أو شتاء. يحتاج بعض الأطفال الأصغر من 9 سنوات إلى جرعتين؛ أسأل مقدم الرعاية الصحية لطفلك عما إذا كان طفلك يحتاج إلى أكثر من جرعة واحدة.

يُوصى بلقاح الإنفلونزا لكل عام لكل شخص عمره 6 شهور فأكثر

يُوصى بإعطاء لقاح كوفيد-19 لكل شخص في عمر 6 شهور فأكثر

- قد لا يحتاج طفلك هذه الجرعة بناءً على العلامة التجارية للقاح الذي يستخدمه مقدم الرعاية الصحية.
- يجب أن يحصل الرضع الذين لم تحصل أمهاتهم على لقاح الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) أثناء الحمل والذين تقل أعمارهم عن 8 أشهر و0 يومًا على الأجسام المضادة الوقائية للفيروس المخلوي التنفسي (RSV-mAb) قبل موسم الفيروس المخلوي التنفسي أو خلاله (عادةً من أكتوبر إلى مارس). يحتاج بعض الأطفال المعرضين لخطر مرتفع (من 8 إلى 19 شهرًا) إلى RSV-mAb قبل موسم RSV الثاني.
- يمكن إعطاء جرعة DTaP هذه مبكرًا عند عمر 12 شهرًا إذا مضت 6 شهور على الجرعة السابقة.
- يحتاج الأطفال بعمر 5 سنوات أو أكبر عمومًا إلى جرعة واحدة فقط. يتم تحديد عدد الجرعات للأطفال من عمر 6 أشهر إلى 4 سنوات حسب العلامة التجارية للقاح.
- يُوصى بإعطاء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و16 عامًا و يعيشون في بورتوريكو، وساموا الأمريكية، وجزر العذراء الأمريكية، وولايات ميكرونيزيا المتحدة، وجمهورية جزر مارشال، وجمهورية بالاو، والذين تأكد مختبريًا إصابتهم سابقًا بحمى الضنك سلسلة مكونة من 3 جرعات من لقاح حمى الضنك.
- لقاح HPV روتيني في سن 11 أو 12 عامًا، لكن يمكن أن يبدأ في سن 9 سنوات.
- سيحتاج الأطفال الذين يعانون من حالات طبية مُعَيَّنة إلى جرعة ثالثة.
- يمكن إعطاء هذا اللقاح للمراهقين الأصحاء. يُوصى به أيضًا للمراهقين الذين يعانون من حالات صحية مُعَيَّنة.
- قد يحتاج المراهق أيضًا إلى جرعة إضافية بناءً على توصية مقدم الرعاية الصحية.
- عند الحاجة إلى لقاحي MenACWY وMenB، يمكن استخدام لقاح MenABCWY المتقارن.

